

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**Лактонорм**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Лактонорм

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** лактобактерии ацидофильные

**Лекарственная форма:** капсулы вагинальные

**Состав на одну капсулу:**

*действующее вещество:* лактобактерии ацидофильные живые\* – не менее  $10^8$  КОЕ;

*вспомогательные вещества:* магния стеарат – 3,00 мг, лактозы моногидрат – достаточное количество до получения массы содержимого капсулы – 400,0 мг.

Капсулы твердые желатиновые прозрачные № 0

*Корпус:* желатин - 100 %

*Крышечка:* желатин - 100 %

\* действующее вещество представляет собой лиофилизат, содержащий лактобактерии *Lactobacillus acidophilus*.

**Описание:** капсулы твердые желатиновые прозрачные № 0. Содержимое капсулы – порошок от белого до светло-коричневого цвета, допускается наличие вкраплений светло-коричневого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:**

мочеполовая система и половые гормоны; противомикробные препараты и антисептики применяемые в гинекологии; противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами; другие противомикробные препараты и антисептики; лактобациллы.

**Код АТХ:** G01AX14.

**Фармакологические свойства**

Фармакодинамика

Входящие в состав препарата Лактонорм ацидофильные лактобактерии штаммов NK<sub>1</sub>, NK<sub>2</sub>, NK<sub>5</sub>, NK<sub>12</sub> относятся к представителям нормальной микрофлоры человека. Лактобактерии нормализуют, поддерживают и регулируют физиологическое равновесие микрофлоры

влагалища. По результатам исследований *in vitro* лактобактерии NK<sub>1</sub>, NK<sub>2</sub>, NK<sub>5</sub>, NK<sub>12</sub> не усиливают рост грибов рода *Candida albicans*.

#### Фармакокинетика

Компоненты препарата не всасываются из влагалища и не оказывают системного действия.

#### **Показания к применению**

Лечение и профилактика вагинальных дисбиозов.

Комплексное лечение:

- острых, подострых, хронических вульвитов и вагинитов,
- постменопаузального атрофического вагинита,
- бактериального вагиноза после проведения антибактериальной терапии.

Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений, дисбиотических изменений урогенитального тракта на фоне антибактериальной терапии.

Подготовка к проведению плановых гинекологических операций и предродовая подготовка беременных женщин, входящих в группу риска в отношении воспалительных заболеваний.

#### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ.

Не рекомендуется применять при симптомах вульвовагинального кандидоза («молочницы»).

#### **Меры предосторожности при применении**

Применение препарата не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Препарат можно использовать в период беременности и грудного вскармливания.

#### **Способ применения и дозы**

Способ применения – интравагинально.

С лечебной целью: 1 капсула 2 раза в день (утром и вечером) в течение 7 дней. В случае необходимости курс лечения может быть продлен.

С профилактической целью: 1 капсула 1 раз в день на ночь в течение 7-14 дней.

Лечение и/или профилактику следует проводить сразу после менструации.

#### Дети

Применение у пациентов младше 18 лет возможно по рекомендации врача с учетом характера заболевания и индивидуальных особенностей.

#### **Указания по использованию**

Перед введением вагинальной капсулы необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Существует несколько положений для ввода препарата: лежа на спине, сидя на биде/унитазе или стоя.

Вагинальную капсулу пальцем ввести во влагалище как можно глубже. При необходимости капсулу можно предварительно смочить водой.



#### **Побочное действие**

При применении в рекомендуемых дозах побочные действия не обнаружены. В редких случаях возможно появление аллергических реакций.

#### **Передозировка**

Случаи передозировки не зарегистрированы.

#### **Взаимодействие с лекарственными средствами**

Лактонорм может быть использован в сочетании с другими лекарственными средствами. Применение препарата возможно после местного введения антибактериальных препаратов и/или антисептиков.

#### **Особые указания**

После введения капсулу из влагалища извлекать не следует, т.к. она предназначена для одноразового применения.

Препарат не следует применять перед половым актом. Капсула может быть введена после полового акта и туалета наружных половых органов.

Применение у пациентов младше 18 лет возможно по рекомендации врача с учетом характера заболевания и индивидуальных особенностей.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

### **Форма выпуска**

Капсулы вагинальные.

По 14 или 28 капсул во флакон полимерный, укупоренный крышкой полимерной с силикагелем и контролем первого вскрытия или по 14 капсул в банку полимерную выдувную с натягиваемой крышкой полимерной с силикагелем и картонным вкладышем с контролем первого вскрытия.

1 флакон или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре от 2 до 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Условия транспортирования**

При температуре от 2 до 8 °С.

### **Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей**

Акционерное общество "Отисифарм" (АО "Отисифарм"), Россия

123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 12, пом. 11, ком. 29,

тел.: +7 (800) 775-98-19,

факс: +7 (495) 221-18-02,

адрес электронной почты: [info@otcpharm.ru](mailto:info@otcpharm.ru)

### **Производитель**

*Производитель, фасовщик (первичная упаковка), упаковщик (вторичная (потребительская) упаковка)*

Закрытое акционерное общество "Фармацевтическая фирма "ЛЕККО" (ЗАО "ЛЕККО"),  
Россия

Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 277.

***Выпускающий контроль качества***

Закрытое акционерное общество "Фармацевтическая фирма "ЛЕККО" (ЗАО "ЛЕККО"),  
Россия

Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 280,  
тел.: +7 (4922) 77-32-90.